

# Vaccino, giovane madre sviene e ha convulsioni dopo l'iniezione

[R21 renovatio21.com/vaccino-giovane-madre-sviene-e-ha-convulsioni-dopo-liniezione/](https://www.renovatio21.com/vaccino-giovane-madre-sviene-e-ha-convulsioni-dopo-liniezione/)

January 1, 2021

La lista conosciuta delle persone che hanno subito pesanti reazioni avverse con il vaccino COVID si allunga ogni giorno di più.

Deborah Tilli, operatrice socio-sanitaria di 27 anni di Hamilton (Ontario, Canada) e madre di due figli, ha avuto una reazione grave al Pfizer-BioNTech. Il vaccino ha innescato una grave reazione che, dice, l'ha fatta svenire, soffrire di diverse crisi epilettiche, richiedere la rianimazione cardio-polmonare e sentire ancora gli effetti quasi una settimana dopo.

Il vaccino ha innescato una grave reazione che, dice, l'ha fatta svenire, soffrire di diverse crisi epilettiche, richiedere la rianimazione cardio-polmonare e sentire ancora gli effetti quasi una settimana dopo

Quando inizialmente ha scoperto che stava per fare il vaccino, dice la Tilli, era entusiasta. «Non avevo paura, ero eccitata. Ero tipo, “Sarò uno dei primi operatori sanitari della città a ottenere il vaccino”», ha detto alla testata canadese *CBC*.

Giovedì alle 11:15 circa, si stava preparando a farsi vaccinare. Ha compilato i moduli di consenso e ha aspettato di essere sottoposta a screening. È stato allora che Tilli ha notato che qualcosa non andava: sostiene che l'infermiera che stava esaminando la sua cartella non era sicura di quello che stavano facendo.

«Ho una grave allergia ai bombi, e l'infermiera ha esaminato la cosa con me e mi ha persino interrogato, ma... sembrava che non sapesse davvero cosa stesse facendo», ha detto Tilli.

Dopo la puntura, si aspettava di aspettare solo 15 minuti prima di tornare a casa, dice. Invece, Tilli ha iniziato a sentirsi stordita. Poi, come un graffio alla gola.

Dopo la puntura, ha iniziato a sentirsi stordita. Poi, come un graffio alla gola. Il paramedico ha controllato i suoi organi vitali e ha notato che la sua frequenza cardiaca era alta. I sintomi sono peggiorati

Deborah ha liquidato la sensazione come nervosismo, dice, ma i sintomi non scomparivano. Quindi, ha contattato un paramedico per sapere cosa stava succedendo.

La ragazza racconta che il paramedico ha controllato i suoi organi vitali e ha notato che la sua frequenza cardiaca era alta. Le sarebbe stata praticata un'iniezione di Benadryl (un antistaminico) che è parsa funzionare per alcuni minuti. Tuttavia i sintomi sono tornati

e sono peggiorati.

«Il supervisore dei paramedici era lì e ha detto solo “OK, diamole l’EpiPen”», ha detto Tilli. L’EpiPen è un autoiniettore di epinefrina portato con sé da persone con gravi allergie e con il rischio di shock anafilattico.

«Entro un minuto, ho detto, “Qualcosa non si sente bene nel mio corpo” e ricordo di essere svenuta chinandomi verso destra».

La ragazza è stata portata all’ospedale, dove si è svegliata e, racconta, ha avuto convulsioni che hanno richiesto la rianimazione cardio-polmonare.

La ragazza è quindi stata portata all’ospedale, dove si è svegliata e, racconta, ha avuto convulsioni che hanno richiesto la rianimazione cardio-polmonare.

A questo punto Deborah ha pensato alla morte:

«C’è stato un momento in cui, non voglio dire che avevo rinunciato, ma era proprio il momento del “Sia come sia”».

Deborah ha pensato alla morte: «C’è stato un momento in cui, non voglio dire che avevo rinunciato, ma era proprio il momento del “Sia come sia”».

«Quando ero a letto, l’altra sera, ho pensato, “Che cosa succede se lascio le mie due ragazze senza una madre?”» .

Tilli dice che la sua mente è annebbiata e le sue costole sono doloranti. Non è sicura di quando tornerà alla normalità e si preoccupa per le crisi future, preoccupandosi anche di come la situazione potrebbe portarla a perdere la patente o anche il suo lavoro.

«Non c’è nessuno qui per pagare i miei conti. Sono una madre single di due bambini».

# Vaccino, grave reazione allergica di un medico di Boston a pochi minuti dall'iniezione

[R21 renovatio21.com/vaccino-grave-reazione-allergica-di-un-medico-di-boston-a-pochi-minuti-dalliniezione/](https://renovatio21.com/vaccino-grave-reazione-allergica-di-un-medico-di-boston-a-pochi-minuti-dalliniezione/)

December 31, 2020

Un medico di Boston ha affermato di aver sviluppato una grave reazione allergica pochi minuti dopo aver ricevuto il vaccino contro coronavirus di Moderna lo scorsa giovedì, nella prima settimana del lancio a livello nazionale per il farmaco dell'azienda. Lo riporta il *New York Times*.

Il caso è stato il primo del suo genere segnalato per essere collegato al vaccino di Moderna. Le agenzie federali stanno indagando su almeno sei casi che coinvolgono persone che hanno sofferto di anafilassi (la reazione allergica che nelle forme gravi è chiamata «shock anafilattico») dopo aver ricevuto il vaccino Pfizer-BioNTech, che contiene ingredienti simili, durante le prime settimane della sua distribuzione negli Stati Uniti.

| Il caso è stato il primo del suo genere segnalato per essere collegato al vaccino di Moderna

I funzionari della Food and Drug Administration (FDA) e dei Centers for Disease Control (CDC) avevano discusso le reazioni che coinvolgono alcuni dei casi Pfizer, ma non hanno determinato se un ingrediente del vaccino abbia causato le risposte allergiche.

Alcuni operatori sanitari in Gran Bretagna avevano anche sperimentato anafilassi dopo aver ricevuto il vaccino Pfizer all'inizio di questo mese.

L'incidente di giovedì ha coinvolto il dottor Hossein Sadrzadeh, un oncologo geriatrico del Boston Medical Center, che ha una grave allergia ai crostacei e aveva un appuntamento per farsi iniettare il vaccino Moderna nel pomeriggio. In un'intervista, il dottor Sadrzadeh ha detto di aver sperimentato una reazione grave quasi immediatamente dopo essere stato inoculato, sentendosi stordito e con il cuore che batteva all'impazzata.

| Il dottor Sadrzadeh ha detto di aver sperimentato una reazione grave quasi immediatamente dopo essere stato inoculato, sentendosi stordito e con il cuore che batteva all'impazzata

In una dichiarazione, David Kibbe, portavoce del Boston Medical Center, ha confermato che il dottor Sadrzadeh aveva ricevuto giovedì il vaccino di Moderna.

La dichiarazione diceva che il dottor Sadrzadeh «sentiva che stava sviluppando una reazione allergica e gli era stato permesso di auto-somministrarsi il suo EpiPen personale. È stato portato al pronto soccorso, valutato, curato, osservato e dimesso. Sta andando bene oggi».

Dopo i casi iniziali che accompagnano gli iniezioni Pfizer, il CDC ha emesso un avviso che i vaccini Pfizer e Moderna potrebbero non essere appropriati per le persone con una storia di allergie agli ingredienti in entrambe le iniezioni. L'anafilassi, che in genere si verifica entro pochi minuti dall'esposizione a una sostanza scatenante, può compromettere la respirazione e causare brusche cadute della pressione sanguigna, w potenzialmente portare alla morte.

L'anafilassi, che in genere si verifica entro pochi minuti dall'esposizione a una sostanza scatenante, può compromettere la respirazione e causare brusche cadute della pressione sanguigna, w potenzialmente portare alla morte

L'agenzia ha raccomandato che le persone con altre allergie dovrebbero comunque ricevere l'iniezione e attendere i 15 minuti standard prima di lasciare il sito di vaccinazione. Chiunque abbia avuto in precedenza una reazione anafilattica a una sostanza, incluso un altro vaccino o un farmaco iniettabile, deve essere monitorato per altri 15 minuti.

Nel caso giovedì, il dottor Sadrzadeh ha detto di aver portato il suo EpiPen (un autoiniettore di epinefrina in grado di contrastare alla bisogna lo shock anafilattico) all'appuntamento per il vaccino a causa delle sue gravi allergie.

Ha detto che entro pochi minuti dall'iniezione del vaccino alle 15:30, la sua frequenza cardiaca era aumentata a 150 battiti al minuto, circa il doppio della sua cadenza normale; la sua lingua formicolò e divenne insensibile. In poco tempo, si è sentito fradicio di sudore freddo e si è ritrovato stordito e con la sensazione di star per svenire. Anche la sua pressione sanguigna è precipitata, ha detto.

Entro pochi minuti dall'iniezione del vaccino alle 15:30, la sua frequenza cardiaca era aumentata a 150 battiti al minuto, circa il doppio della sua cadenza normale; la sua lingua formicolò e divenne insensibile. In poco tempo, si è sentito fradicio di sudore freddo e si è ritrovato stordito e con la sensazione di star per svenire. Anche la sua pressione sanguigna è precipitata

Il suo sistema immunitario, si è reso conto, era in rivolta.

«E 'stata la stessa reazione anafilattica che provo con i crostacei», ha detto il dottor Sadrzadeh.

Il dottor Sadrzadeh ha usato il suo EpiPen ed è stato portato su una barella al pronto soccorso, dove gli sono stati somministrati diversi farmaci, inclusi steroidi e Benadryl, per calmare le reazioni immunitarie che avevano sopraffatto il suo corpo.

Una registrazione della sua visita dichiara che è stato «visitato al pronto soccorso per mancanza di respiro, vertigini, palpitazioni e intorpidimento dopo aver ricevuto il vaccino COVID-19».

Nessuno degli ingredienti dei vaccini mRNA di Moderna e Pfizer-BioNTech è stato identificato come contenente allergeni comuni. Tuttavia diversi esperti hanno cautamente indicato il polietilenglicole, o PEG, che appare in entrambe le ricette, anche se in formulazioni leggermente diverse, come possibile colpevole.

È stato portato su una barella al pronto soccorso, dove gli sono stati somministrati diversi farmaci, inclusi steroidi e Benadryl, per calmare le reazioni immunitarie che avevano sopraffatto il suo corpo: «visitato al pronto soccorso per mancanza di respiro, vertigini, palpitazioni e intorpidimento dopo aver ricevuto il vaccino COVID-19»

Il PEG si trova in uno stuolo di prodotti farmaceutici, inclusi gel per ultrasuoni, lassativi e steroidi iniettabili e le allergie ad esso sono estremamente rare.

Del pericolo del PEG nei candidati vaccini COVID *Renovatio 21* aveva pubblicato un articolo assai completo ancora quattro mesi mesi fa.

