

Vaccino, bambina di 9 anni morta due settimane dopo l'iniezione

R21 renovatio21.com/vaccino-bambina-di-9-anni-morta-due-settimane-dopo-liniezione/

admin

2 agosto 2022



Nel più grande studio di questo tipo fino ad oggi, il 42% delle donne che avevano regolarmente le mestruazioni ha riportato emorragie da rottura dopo aver fatto un vaccino contro il COVID-19.

Il campione del sondaggio includeva 39.129 partecipanti attualmente e in precedenza con mestruazioni di età compresa tra 18 e 80 anni che erano state completamente vaccinate con i vaccini Pfizer-BioNTech, Moderna, J&J, Novavax o AstraZeneca e non avevano precedentemente avuto COVID-19.

Tra i partecipanti che in genere non hanno le mestruazioni, il 71% delle persone che assumevano contraccettivi a lunga durata d'azione, il 39% delle persone che assumevano ormoni per il cambio genere e il 66% delle donne in postmenopausa hanno riportato sanguinamento da rottura.

Tra le donne in premenopausa non mestruate in trattamento ormonale, il 65,7% ha avuto un'emorragia da rottura dopo aver ricevuto un vaccino contro il COVID-19 e il 66,0% degli intervistati in postmenopausa ha riportato un'emorragia da rottura.

I ricercatori hanno affermato che la combinazione di una storia riproduttiva che include essere incinta ma non partorire in passato è associata al più alto rischio di flusso più pesante, sebbene essere stata incinta e parto fosse anche associata a un flusso più pesante.