


I documenti della sperimentazione clinica di Pfizer dimostrano che i vaccini COVID distruggono il sistema immunitario


databaseitalia.it/i-documenti-della-sperimentazione-clinica-di-pfizer-dimostrano-che-i-vaccini-covid-distruggono-il-sistema-immunitario/

7 novembre 2022



Ho scoperto alcuni risultati estremamente preoccupanti nei dati degli studi clinici di fase I-II-III della Pfizer. Il tasso di mortalità per sepsi nel gruppo di 21.926 vaccinati con doppia vaccinazione dello studio clinico di fase III Pfizer era ventuno volte superiore al normale e il tasso di mortalità cardiovascolare era due volte superiore al normale.

Ciò indica fortemente che l'iniezione di Pfizer Covid-19 provoca in effetti una nuova forma di "sindrome da immunodeficienza acquisita", come è stato suggerito da una montagna di dati disponibili dall'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito, perché la sepsi è causata dal fallimento del sistema immunitario.



Ecco la tabella dei decessi per lo studio Pfizer dalla dose 1 (luglio 2020) allo smascheramento dopo 6 mesi (gennaio 2021) –

Pfizer Phase I-II-III trial deaths from Dose1 to unblinding after 6 months		
Group >16 year old	21,926 double vaxxed	21,921 unvaxxed
Deaths	15 + (2)	14 + (5)
Acute respiratory failure	0	1
Aortic rupture	0	(1)
Arteriosclerosis - C	2	0
Biliary cancer metastatic	0	1
COVID-19	0	2
COVID-19 pneumonia	1	0
Cardiac arrest - C	4	1
Cardiac failure congestive - C	1	0
Cardiorespiratory arrest - C	1	1
Chronic obstructive pulmonary disease	(1)	0
Death	0	(1)
Dementia	0	(1)
Emphysematous cholecystitis - I	1	0
Hemorrhagic stroke - C	0	1
Hypertensive heart disease - C	1	0
Lung cancer metastatic	1	0
Metastases to liver	0	1
Went Missing	0	(1)
Multiple organ dysfunction syndrome	0	2
Myocardial infarction - C	0	2
Overdose	0	(1)
Pneumonia	0	2
Sepsis - I	1	0
Septic shock - I	1	0
Shigella sepsis - I	1	0
Unevaluable event	(1)	0
(n) discounted deaths from both groups which were not relevant to the intervention		

Fonte – Pagina 10

La sepsi/setticemia deriva dall'incapacità del sistema immunitario di sconfiggere un'infezione microbica (lievito virale o batterico).

La colecistite enfisematosa è una variante relativamente rara della colecistite acuta con infezione da organismi produttori di gas. La diagnosi prevede la dimostrazione di gas all'interno della parete della cistifellea mediante ecografia o TAC. Contrariamente alla

colecistite acuta, la colecistite enfisematosa si verifica più comunemente nei pazienti anziani e diabetici ed è frequentemente associata a perforazione e morte. –

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12768870/>

È il risultato di un'incapacità del sistema immunitario di sconfiggere un'infezione microbica (lievito virale o batterico).

Colecistite acuta. La causa più frequente di colecistite acuta sono i calcoli biliari. Altre cause includono la febbre tifoide e un tumore maligno che ostruisce le vie biliari. L'infiammazione può essere secondaria a sepsi sistemica. <https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/enfisematous+colecistite>

La colecistite acuta è una sepsi biliare, una sepsi della cistifellea e dei dotti biliari.

Pfizer Phase I-II-III Trial Group	21,926 doubly vaxxed	%	21,921 unvaxxed	%	21,923 randomised population	%
Deaths from all causes during 6 months trial	17	100%	19	100%	111.2	100%
Death from all vaccine relevant causes.	15	88,2%	14	73.7%		
Covid-19 deaths	1	5.9%	2	10.5%	11.4	10.3%
Cardiovascular deaths (Heart Disease + Stroke) - C	9	52.9%	5	26.3%	22.9 + 5.3 = 28.2	20.6% + 4.7% = 25.3%
Sepsis deaths - I	4	23.5%	0	0%	1.3	1.1%

clicca per ingrandire

Ecco i decessi negli Stati Uniti nel 2020 per causa e le percentuali per ciascuna causa.

US Deaths in 2020 per year	Number	US population 2020	%
Total	3,358,814	331,002,647	100.0%
Heart Disease	690,882	331,002,647	20.6%
Cancer	598,932	331,002,647	17.8%
Covid-19	345,323	331,002,647	10.3%
Accidents	192,176	331,002,647	5.7%
Stroke	159,050	331,002,647	4.7%
Respiratory Disease	151,637	331,002,647	4.5%
Alzheimers	133,382	331,002,647	4.0%
Diabetes	101,106	331,002,647	3.0%
Flu and Pneumonia	53,495	331,002,647	1.6%
Kidney Disease	52,260	331,002,647	1.6%
Suicide	44,834	331,002,647	1.3%
Septicemia (Sepsis) (2019)	38,354	331,002,647	1.1%
Other	797,383	331,002,647	23.7%

<https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2778234>

<https://wonder.cdc.gov>

La prima cosa che salta fuori da queste cifre è che i partecipanti allo studio Pfizer avevano un tasso di mortalità di 17/19 per 21.921/6 per 6 mesi. Considerando che la popolazione generale degli Stati Uniti ha un tasso di mortalità di 111,2 per 21.923 per 6 mesi. Quindi i partecipanti allo studio Pfizer avevano una probabilità 6 volte inferiore di morire rispetto al pubblico in generale.

Il profilo di età della selezione originale dei partecipanti è pubblicizzato come:

- 12-15 anni: 2260,
- 16-17 anni: 754,
- 18-55 anni: 25.427
- 56+ anni: 17.879
- <https://www.pfizer.com/science/coronavirus/vaccine/about-our-landmark-trial>

Quindi Pfizer deve aver fatto alcune esclusioni estremamente pesanti di morbilità per ottenere una cifra di mortalità così assurdamente bassa. Il loro protocollo di studio rivela chi hanno escluso – <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728>

La prossima cosa è l'incredibile corrispondenza tra il Covid dei non vaccinati e i tassi di mortalità cardiovascolare (10,5% e 26,3%) e quelli della popolazione generale per il 2020 (10,3% e 25,3%). Quindi, anche se il numero di morti è piccolo. Sembrano essere un'ottima rappresentazione della realtà nel grande pubblico.

Pfizer Phase I-II-III Trial Group	21,926 doubly vaxxed	%	21,921 unvaxxed	%	21,923 randomised population	%
Deaths from all causes during 6 months trial	17	100%	19	100%	111.2	100%
Death from all vaccine relevant causes.	15	88,2%	14	73.7%		
Covid-19 deaths	1	5.9%	2	10.5%	11.4	10.3%
Cardiovascular deaths (Heart Disease + Stroke) - C	9	52.9%	5	26.3%	22.9 + 5.3 = 28.2	20.6% + 4.7% = 25.3%
Sepsis deaths - I	4	23.5%	0	0%	1.3	1.1%

clicca per ingrandire

Ora passiamo al doppio tasso di vaccinazione. Problemi cardiovascolari e di sepsi e vediamo (52,9% e 23,5% di mortalità) rispetto alla popolazione generale (e ai non vaccinati) che ne soffre solo (26,3% e 1,1% o 25,3% e 0%).

E c'è la tossicità della vaccinazione Pfizer messa a nudo. Indebolisce il sistema immunitario al punto che le persone soccombono alle infezioni microbiche e muoiono a 21 volte il tasso normale nei primi 6 mesi dopo la vaccinazione.


Si può obiettare che il numero di decessi qui non è abbastanza grande da trarre conclusioni statistiche valide. Ma contro ciò, i numeri dei non vaccinati sono molto chiaramente rappresentativi e il numero dei partecipanti in entrambi i gruppi è abbastanza grande da trarre conclusioni statistiche valide.

Terza Dose e Sindrome da Immunodeficienza Acquisita. Il Ritmo è Allarmante Secondo i Dati del Governo del Regno Unito

Quando si combinano queste cifre con la degradazione settimanale della risposta immunitaria del 5% catalogata dall'UKHSA dalle settimane 35-41 , si inizia a vedere un'immagine che suggerisce che i vaccinati stanno sviluppando la sindrome da immunodeficienza acquisita.

Leggi anche:

- LA CATASTROFE ALLE PORTE. STUDIO SUL THE JOURNAL OF INFECTION: RISCHIO ALTO DI ADE PER I VACCINATI
- Documenti ufficiali dimostrano che le autorità stanno usando il vaiolo delle scimmie per coprire la sindrome da immunodeficienza acquisita come effetto avverso dei "vaccini" Covid
- Il dottor Robert Malone spiega la nuova sindrome da immunodeficienza acquisita – VIDEO
- Terza Dose e Sindrome da Immunodeficienza Acquisita. Il Ritmo è Allarmante Secondo i Dati del Governo del Regno Unito
- Vaiolo delle scimmie? Epatite? Sindrome della morte improvvisa dell'adulto? Qualcosa non va ed è a causa dei vaccini Covid-19
- FAKE MEDIAPOX: MENZOGNE PER COPRIRE DANNI SIERI COVID-19? VIDEO
- FDA RILASCIATA ULTIMO FALDONE DI DOCUMENTI INTERNI PFIZER COVID-19 SU ORDINE DEL TRIBUNALE | Erano a conoscenza dell'ADE indotto dal vaccino e hanno collaborato per coprirlo
- Viganò mette in guardia i vescovi Usa sul siero COVID: Il Grande Reset vuole 'miliardi di malati cronici'



Comunque guardi questo, i numeri segnalano due grandi preoccupazioni che in questi giorni hanno molte altre prove statistiche, mass media, cliniche e aneddotiche da supportare.

Questi risultati richiedono assolutamente ulteriori indagini specifiche sulla degradazione del sistema immunitario e sull'infiammazione cardiovascolare. Ma Pfizer ha sbloccato il gruppo placebo e ha permesso loro di vaccinarsi alla fine del periodo di prova di 6 mesi. Quindi è difficile vedere come possiamo ottenere altri dati da Pfizer.

Ad essere sinceri, siamo fortunati ad avere i dati sulla morte che hanno fornito finora. Affrontiamo i fatti. Non sono in corso studi clinici a lungo termine sulla sicurezza di questi vaccini. Anzi, proprio il contrario. Perché si può sostenere che lo scopo degli obblighi vaccinali esercitato da Pfizer è quello di sradicare dall'esistenza qualsiasi gruppo di controllo non vaccinato al fine di impedire una corretta valutazione degli effetti collaterali del vaccino a medio termine.

Esistono anche ulteriori prove che confermano che i vaccini Covid distruggono il sistema immunitario, sotto forma di ammissione da parte del CDC in risposta a una richiesta di libertà di informazione.

Il CDC afferma di non avere registrazioni di una persona con immunità naturale che si sia reinfezata e che trasmetta il virus a nessuno.

Considerando che l' UKHSA aveva 450.992 record di persone con doppia immunità vaccinale che sono state infettate da Covid solo tra ottobre e novembre 2021.

Quindi è abbastanza chiaro che i vaccini Covid-19 impediscono alle persone di raggiungere la piena immunità naturale danneggiando e degradando il loro sistema immunitario?



November 05, 2021

SENT VIA EMAIL

Elizabeth Brehm
Attorney
Siri & Glimstad
200 Park Avenue, 17th Floor
New York, New York 10166
foia@sirillp.com

2nd Letter Subject: Final Response Letter

Dear Ms. Brehm:

The Centers for Disease Control and Prevention and Agency for Toxic Substances and Disease Registry (CDC/ATSDR) received your September 02, 2021, Freedom of Information Act (FOIA) request on September 02, 2021, seeking:

“Documents reflecting any documented case of an individual who: (1) never received a COVID-19 vaccine; (2) was infected with COVID-19 once, recovered, and then later became infected again; and (3) transmitted SARS-CoV-2 to another person when reinfected.”

A search of our records failed to reveal any documents pertaining to your request. The CDC Emergency Operations Center (EOC) conveyed that this information is not collected.

You may contact our FOIA Public Liaison at 770-488-6277 for any further assistance and to discuss any aspect of your request. Additionally, you may contact the Office of Government Information Services (OGIS) at the National Archives and Records Administration to inquire about the FOIA mediation services they offer. The contact information for OGIS is as follows: Office of Government Information Services, National Archives and Records Administration, 8601 Adelphi Road-OGIS, College Park, Maryland 20740-6001, e-mail at ogis@nara.gov; telephone at 202-741-5770; toll free at 1-877-684-6448; or facsimile at 202-741-5769.

If you are not satisfied with the response to this request, you may administratively appeal by writing to the Deputy Agency Chief FOIA Officer, Office of the Assistant Secretary for Public Affairs, U.S. Department of Health and Human Services, Hubert H. Humphrey Building, 200 Independence Avenue, Suite 729H, Washington, D.C. 20201. You may also transmit your appeal via email to FOIARequest@psc.hhs.gov. Please mark both your appeal letter and envelope “FOIA Appeal.” Your appeal must be postmarked or electronically transmitted by February 03, 2022.

Sincerely,

Roger Andoh
CDC/ATSDR FOIA Officer
Office of the Chief Operating Officer
Phone: (770) 488-6399
Fax: (404) 235-1852

#21-02152-FOIA

[clicca per ingrandire](#)[The Exposé](#)